

RAPS			
Schädling	Bekämpfungsschwelle	Kontrollzeitpunkt	Kontrollmethode
Großer Rapsstengelrüßler, Gefleckter Kohltriebrüßler	10 Käfer/Gelbschale innerhalb von 3 Tagen	im Frühjahr ab + 5-6 C Boden- bzw. + 11-12 C Lufttemperatur ("erste Föhntage"),	je Feldseite eine Gelbschale, ev. eine am Rapsschlag d. Vorjahres
Rapsglanzkäfer <i>(Meligethes aeneus)</i>	1 - 2 Käfer/Pflanze	sehr früh an noch verdeckten Knospen	zählen: 10 Gruppen à 10 Pflanzen
	4 Käfer/Pflanze	ca. 14 Tage vor der Blüte	- " -
	5 -6 Käfer/Pflanze	kurz vor der Blüte	- " -
	10 Käfer/Pflanze	kurz vor der Blüte (gut entwickelte Bestände)	
GETREIDE			
Schädling	Bekämpfungsschwelle	Kontrollzeitpunkt	Kontrollmethode
Getreidehähnchen <i>(Oulema melanopus,</i> <i>Oulema lichenes)</i>	(0,5)1 - 1,5 Eier oder Larven oder Hähnchen/Fahnenblatt oder 10 (20) % Blattflächenverlust	Ende des Schossens bis zur Milchreife (ES 39 - 75)	abzählen; schätzen